

# Diferenciální rovnice – základní pojmy. Rovnice se separovanými proměnnými.

Vyšší matematika

LDF MENDELU

Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu <http://akademie.ldf.mendelu.cz/cz> (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0021) za přispění finančních prostředků EU a státního rozpočtu České republiky.

---

# Diferenciální rovnice - úvod

**Diferenciální rovnice** je vztah mezi neznámou funkcí a jejími derivacemi. **Řádem diferenciální rovnice** rozumíme řád nejvyšší derivace neznámé funkce v dané rovnici.

Příklady diferenciálních rovnic:

- $xy' - y^3 = 0$  je diferenciální rovnice prvního řádu
- $yy'' - 3xy' = \sqrt{xy}$  je diferenciální rovnice druhého řádu
- $y''' - 4y' + 5y = x$  je diferenciální rovnice třetího řádu

## Diferenciální rovnice prvního řádu – základní pojmy

### Definice (DR prvního řádu)

**Diferenciální rovnice prvního řádu rozřešená vzhledem k derivaci** je rovnice tvaru

$$(DR) \quad y' = \varphi(x, y),$$

kde  $\varphi$  je funkce dvou proměnných.

**Řešením** rovnice (DR) na intervalu  $I$  rozumíme každou funkci  $y = y(x)$ , která rovnici na  $I$  splňuje.

- Zpravidla lze téměř všechna řešení rovnice (DR) vyjádřit pomocí jediného vzorce, který obsahuje nějakou konstantu  $c$ , tj.  $y = y(x, c)$ , případně  $\phi(y, x, c) = 0$ . Všechna tato řešení nazýváme **obecné řešení**. Obecné řešení může, ale nemusí obsahovat úplně všechna řešení.
- **Partikulárním řešením** rozumíme jednu konkrétní funkci, která rovnici splňuje. Volbou konkrétní konstanty v obecném řešení obdržíme jedno partikulární řešení.
- Graf libovolného partikulárního řešení se nazývá **integrální křivka**.

# Geometrický význam

Diferenciální rovnici

$$y' = \varphi(x, y)$$

můžeme chápat jako předpis, který každému bodu  $(x, y) \in D(\varphi)$  přiřadí směrnici tečny k integrální křivce, která tímto bodem prochází.

Pokud pro dostatečný počet bodů  $(x, y)$  nakreslíme krátké úsečky (tzv. **lineární elementy**) procházející těmito body a mající směrnici  $\varphi(x, y)$  (jsou to tečny k integrálním křivkám), dostáváme tzv. **směrové pole**. Někdy je možné tímto způsobem odhadnout tvar integrálních křivek.


## Příklad

Pomocí směrového pole odhadněte tvar integrálních křivek rovnice  $y' = -\frac{x}{y}$ .

$$-\frac{x}{y} = c, \quad c \in \mathbb{R}, \quad y \neq 0 \implies y = -\frac{x}{c}$$

Konstanta  $c$  vyjadřuje směrnici tečny k integrální křivce (kreslíme jako krátkou úsečku – lineární element).

$$\begin{aligned}c = 0 &: x = 0 \\c = 1 &: y = -x \\c = 2 &: y = -\frac{1}{2}x \\c = -1 &: y = x \\c = -2 &: y = \frac{1}{2}x \\c = -\frac{1}{2} &: y = 2x\end{aligned}$$



Integrální křivky jsou půlkružnice se středem v počátku.

# Počáteční úloha

## Definice (Počáteční úloha)

Nechť  $x_0, y_0 \in \mathbb{R}$ . Úloha najít řešení rovnice (DR), které splňuje tzv. **počáteční podmínku**

$$y(x_0) = y_0,$$

se nazývá **počáteční úloha**. Jejím řešením je funkce, která splňuje počáteční podmínku a je na nějakém otevřeném intervalu obsahujícím bod  $x_0$  řešením rovnice (DR).

- Řešení počáteční úlohy je partikulární řešení, jehož integrální křivka prochází bodem  $(x_0, y_0)$ .
- Má-li počáteční úloha jediné řešení, znamená to, že bodem  $(x_0, y_0)$  prochází jediná integrální křivka.
- Má-li každá počáteční úloha jediné řešení, znamená to, že integrální křivky se nikde neprotínají.

## Diferenciální rovnice $y' = f(x)$

Rovnice

$$y' = f(x)$$

je nejjednodušším příkladem diferenciální rovnice. Tuto rovnici splňuje každá primitivní funkce k funkci  $f$ . Obecné řešení lze tedy vyjádřit vzorcem

$$y(x, c) = \int f(x) dx + c.$$

## Příklad

Řešte diferenciální rovnici  $y' = 2x$ . Najděte všechna řešení a řešení počáteční úlohy a podmínkou  $y(1) = 3$ . Nakreslete integrální křivky.

- Všechna řešení = obecné řešení:

$$y = x^2 + c, \quad c \in \mathbb{R}$$


- Řešení počáteční úlohy:

podmínku  $y(1) = 3$  dosadíme do obecného řešení a najdeme hodnotu konstanty, pro kterou je podmínka splněna:

$$3 = 1^2 + c \implies c = 2$$

$$y_p = x^2 + 2$$

- Integrální křivky:



## Diferenciální rovnice se separovanými proměnnými

### Definice (DR se separovanými proměnnými)

Nechť  $f$  a  $g$  jsou funkce spojité na nějakých otevřených intervalech. Diferenciální rovnice

$$(S) \quad y' = f(x)g(y)$$

se nazývá **diferenciální rovnice se separovanými proměnnými**.

Použijeme-li označení derivace  $y' = \frac{dy}{dx}$ , můžeme rovnici (S) ekvivalentně vyjádřit ve tvaru

$$\frac{dy}{dx} = f(x)g(y).$$

## Postup řešení rovnice $y' = f(x)g(y)$

- Najdeme řešení rovnice  $g(y) = 0$ . Tato řešení jsou konstantními řešeními rovnice (S).
- Dále předpokládáme, že  $g(y) \neq 0$ . Derivaci  $y'$  nahradíme podílem  $\frac{dy}{dx}$

$$\frac{dy}{dx} = f(x)g(y)$$

a upravíme tak, aby na každé straně byla pouze jedna proměnná:

$$\frac{dy}{g(y)} = f(x) dx.$$

- Získanou rovnost zintegrujeme

$$\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x) dx.$$

## Postup řešení rovnice $y' = f(x)g(y)$

- Po zintegrování dostaneme rovnost

$$G(y) = F(x) + c,$$

kde  $G$  je primitivní funkce k funkci  $\frac{1}{g}$  a  $F$  je primitivní funkce k funkci  $f$ .

- Rovnicí  $G(y) = F(x) + c$  je určeno obecné řešení (implicitní tvar). Pokud je to možné, vyjádříme z této rovnice  $y$  (tím dostaneme explicitní tvar obecného řešení).
- Je-li možné získat některé z konstantních řešení z obecného řešení vhodnou volbou konstanty  $c$ , pak toto řešení zahrneme do obecného.
- Je-li zadána počáteční podmínka, pak ji dosadíme do obecného řešení, odkud určíme konkrétní hodnotu konstanty  $c$ . Tuto hodnotu pak dosadíme zpět do obecného řešení a získáme tak partikulární řešení – řešení počáteční úlohy. Také zjistíme, zda počáteční podmínku případně nespĺňuje některé konstantní řešení, které v obecném řešení není zahrnuto.

## Příklad

Řešte počáteční úlohu  $y' = -\frac{x}{y}$ ,  $y(0) = -1$ .


$$f(x) = -x, g(y) = \frac{1}{y}, y \neq 0$$

- Nemá konstantní řešení, neboť  $\frac{1}{y} \neq 0$ .
- Integrální křivky: půlkružnice
- Nekonstantní řešení:

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= -\frac{x}{y} \\ y dy &= -x dx \\ \frac{y^2}{2} &= -\frac{x^2}{2} + c\end{aligned}$$

$$x^2 + y^2 = C, \quad C > 0 \quad (C = 2c) \quad \dots \text{implicitní tvar obecného řešení}$$

$$y = \pm \sqrt{C - x^2} \quad \dots \text{explicitní tvar obecného řešení}$$



- Dosazení počáteční podmínky:

$$0^2 + (-1)^2 = C \implies C = 1 \implies \boxed{y_p = -\sqrt{1 - x^2}}$$


## Příklad

Najděte všechna řešení rovnici  $y' = \frac{2y}{x}$ .

$$f(x) = \frac{2}{x}, g(y) = y, x \neq 0$$

- Konstantní řešení:  $y = 0$
- Nekonstantní řešení:
- Integrální křivky: dvě polopřímky a poloviny parabol vycházející z počátku

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{2y}{x} \\ \frac{1}{y} dy &= \frac{2}{x} dx \\ \ln |y| &= \ln x^2 + c \\ |y| &= e^{\ln x^2 + c} \\ |y| &= x^2 e^c \\ y &= Cx^2 \quad (C = \pm e^c \neq 0)\end{aligned}$$



Konstantní řešení lze pro  $C = 0$  zahrnout do obecného vzorce.

$$\implies \text{obecné řešení: } \boxed{y = Cx^2, C \in \mathbb{R}}$$

## Příklad

Najděte všechna řešení rovnice  $y' = 2\sqrt{y-1}$ .

$$f(x) = 1, g(y) = 2\sqrt{y-1}, y \geq 1$$

- Konstantní řešení:  $y = 1$
- Nekonstantní řešení:

$$\frac{dy}{dx} = 2\sqrt{y-1}$$


$$\frac{1}{2}(y-1)^{-\frac{1}{2}} dy = dx$$

$$\sqrt{y-1} = x + c$$

$$y-1 = (x+c)^2, x > -c$$

$$y = (x+c)^2 + 1, x > -c$$

- Integrální křivky:  
přímka a pravé poloviny  
parabol



Konstantní řešení nelze zahrnout do obecného vzorce.

⇒ obecné řešení:  $y = (x+c)^2, x > -c, c \in \mathbb{R}$ , další řešení:  $y = 1$ .

## Poznámka

- Diferenciální rovnice typu  $y' = f(x)$  a  $y' = g(y)$  jsou speciální případy rovnic se separovanými proměnnými pro  $g(y) = 1$ , resp.  $f(x) = 1$ .
- Počáteční úloha pro rovnici se separovanými proměnnými nemusí mít vždy jediné řešení.

Řešení, které má jednoznačnost porušenou v každém bodě (tj. každým bodem jeho integrální křivky prochází jiná integrální křivka), se nazývá **singulární řešení**.

Singulárními řešeními rovnice se separovanými proměnnými  $y' = f(x)g(y)$  mohou být pouze konstantní řešení, tj. řešení, která splňují rovnici  $g(y) = 0$ .

Například počáteční úloha  $y' = 2\sqrt{y-1}$ ,  $y(0) = 1$  má dvě řešení:

$$y_1 = 1,$$

$$y_2 = \begin{cases} 1 & \text{pro } x \leq 0 \\ x^2 & \text{pro } x > 0, \end{cases}$$

viz předchozí příklad. Funkce  $y_1 = 1$  je singulární řešení rovnice.



# Homogenní diferenciální rovnice

## Definice (Homogenní DR)

Nechť  $f$  je spojitá funkce. Diferenciální rovnice

$$(1) \quad y' = f\left(\frac{y}{x}\right)$$

se nazývá **homogenní diferenciální rovnice**.

## Postup řešení rovnice $y' = f\left(\frac{y}{x}\right)$

- Zavedeme novou funkci  $u$  substitucí  $u = \frac{y}{x}$ .  
Platí

$$y = ux \quad \text{a tedy} \quad y' = u'x + u.$$

- Po dosazení do rovnice dostaneme

$$\begin{aligned} u'x + u &= f(u) \\ u' &= \frac{f(u) - u}{x}, \end{aligned}$$

což je rovnice se separovanými proměnnými. Tuto rovnici vyřešíme, tj. najdeme neznámou funkci  $u$ .

- K nalezení řešení  $y$  původní homogenní rovnice použijeme opět substituci  $u = \frac{y}{x}$  (dosadíme do vztahu pro  $u$  a pokud je to možné, tak vyjádříme  $y$ ).

## Příklad

Najděte všechna řešení rovnice  $xy' = y \ln \frac{y}{x}$ .

$$y' = \frac{y}{x} \ln \frac{y}{x}, \quad u = \frac{y}{x} \Rightarrow y = xu \Rightarrow y' = u + xu'$$

$$u + xu' = u \ln u$$

$$u' = \frac{u \ln u - u}{x} \quad \dots \text{rovnice se separovanými proměnnými}$$

- Konstantní řešení:  $u(\ln u - 1) = 0 \Rightarrow \ln u = 1 \Rightarrow u = e$ .
- Nekonstantní řešení:

$$\frac{du}{dx} = \frac{u(\ln u - 1)}{x}$$

$$\frac{du}{u(\ln u - 1)} = \frac{dx}{x}$$

$$\ln |\ln u - 1| = \ln |x| + c$$

$$|\ln u - 1| = |x|e^c$$

$$\ln u - 1 = Cx \quad (C = \pm e^c \neq 0)$$

$$u = e^{Cx+1}, C \in \mathbb{R} \text{ (pro } C = 0 \text{ konst. řeš.)} \Rightarrow \boxed{y = xe^{Cx+1}, C \in \mathbb{R}}$$

## Využití systémů počítačové algebry

- Využití systémů Sage, Maxima, Wolfram Alpha:  
<http://user.mendelu.cz/marik/akademie/>
- Matematické výpočty online (MAW) - diferenciální rovnice:  
<http://um.mendelu.cz/maw-html/index.php?lang=cs&form=ode>

## Příklad

Najděte všechna řešení diferenciální rovnice  $y' = -\frac{x}{y}$  a řešení splňující počáteční podmínku  $y(0) = -1$ .

Řešení pomocí Wolfram Alpha (<http://www.wolframalpha.com/>):

- Všechna řešení:

`solve y'=-x/y`

- Řešení počáteční úlohy:

`solve y'=-x/y, y(0)=-1`